



Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti
SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA
“Prof.Dr.Dan Theodorescu”
Calea Plevnei nr.17-21 , sector 1 , Bucuresti Tel.021/315.52.17/Fax : 021/315.88.55
www.spitalomf.ro
E-mail: secretariat@spitalomf.ro
Cod fiscal : 4267265

APROB

Director medical interimar,
Dr. Tiberiu Niță



PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE

Grup de lucru

Prof.univ.dr.Alexandru BUCUR -

Conf.univ.dr.Octavian DINCA -

Prezentul protocol a fost avizat în cadrul ședinței Consiliului Medical din data de 19.11.2018
(P.V. nr. 10200/19.11.2018).

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECTIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

Cuprins

| | |
|--|-----------|
| 1. LISTA DE DIFUZARE | 4 |
| 2. SCOP ȘI OBIECTIVE (MOTIVARE ȘI FUNDAMENTARE) | 4 |
| 3. DOMENIU DE APLICARE | 5 |
| 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE PROTOCOLULUI | 5 |
| 5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI | 5 |
| 6. DESCRIEREA PROTOCOLULUI..... | 5 |
| 6.1. PRINCIPII GENERALE DE TRATAMENT ÎN INFECTIILE ORO-MAXILO-FACIALE | 5 |
| 6.2. CLASIFICAREA INFECTIILOR ORO-MAXILO-FACIALE..... | 6 |
| 6.2.1. INFECTII NESPECIFICE | 6 |
| 6.2.1.INFECTII SPECIFICE | 7 |
| 6.3. TIPUL DE ANESTEZIE ÎN INFECTIILE ORO-MAXILO-FACIALE | 7 |
| 6.3.1. ANESTEZIA LOCO-REGIONALĂ..... | 7 |
| 6.3.2. ANESTEZIA GENERALĂ..... | 8 |
| 6.4. CONDIȚII DE TRATAMENT ÎN SECTIA/COMPARTIMENTUL DE CHIRURGIE OMF A PACIENTILOR CU INFECTII ORO-MAXILO-FACIALE..... | 8 |
| 6.5. ANTIBIOTERAPIA PACIENTILOR CU INFECTII ORO-MAXILO-FACIALE | 9 |
| 6.6. FORMELE ANATOMO-CLINICE ALE INFECTIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | 9 |
| 6.6.1.CELULITA..... | 9 |
| 6.6.2.ABCESUL VESTIBULAR..... | 9 |
| 6.6.3.ABCESUL PALATINAL | 10 |
| 6.6.4.ABCESUL SPAȚIULUI FASCIAL AL CORPULUI MANDIBUAR (ABCESUL PERMANDIBULAR EXTERN, PERIBAZILAR)..... | 10 |
| 6.6.5.ABCESUL SPAȚIULUI GENIAN | 10 |
| 6.6.6. ABCESUL SPAȚIULUI PARAMANDIBULAR (ABCESUL BUCCINATO-MAXILAR, ABCESUL MIGRATOR AL OBRAZULUI)..... | 10 |
| 6.6.7. ABCESUL SPAȚIULUI CANIN | 10 |
| 6.6.8. ABCESUL SPAȚIULUI INFRATEMPORAL | 11 |
| 6.6.9. ABCESUL SPAȚIULUI SUBMANDIBULAR | 11 |
| 6.6.10. ABCESUL SPAȚIULUI SUBLINGUAL | 11 |
| 6.6.11. ABCESUL SPAȚIULUI SUBMENTONIER | 11 |
| 6.6.12. ABCESUL SPAȚIULUI MASETERIN | 12 |
| 6.6.13. ABCESUL SPAȚIULUI PTERIGOMANDIBULAR | 12 |
| 6.6.14. ABCESUL SPAȚIULUI TEMPORAL SUPERFICIAL/PROFUND | 12 |
| 6.6.15.ABCESUL SPAȚIULUI LATEROFARINGIAN | 12 |
| 6.6.16. ABCESUL SPAȚIULUI RETROFARINGIAN | 12 |
| 6.6.17.ABCESUL SPAȚIULUI PAROTIDIAN | 13 |

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

| | |
|--|----|
| 6.6.18.ABCESUL DE LIMBĂ (PORTIUNEA PRESULCALĂ)..... | 13 |
| 6.6.19.ABCESUL ORBITEI..... | 13 |
| 6.6.20.FLEGMONUL DE PLANȘEU BUCAL..... | 13 |
| 6.6.21.FLEGMONUL DIFUZ HEMIFACIAL | 13 |
| 6.6.22.FASCIITA NECROZANTĂ..... | 14 |
| 6.6.23. ADENITA | 14 |
| 6.6.24.OSTEOPERIOSTITA | 14 |
| 6.6.25.OSTEITA..... | 15 |
| 6.6.26.OSTEOMIELITA ACUTĂ SUPURATĂ | 15 |
| 6.6.27.OSTEOMIELITA CRONICĂ..... | 15 |
| 6.6.28.NECROZA OSOASĂ POSTIRADIERE..... | 15 |
| 6.6.29.OSTEONECROZA MAXILARELOR DUPĂ TRATAMENT CU BIFOSFONAȚI | 16 |
| 6.6.30. ACTINOMICOZA..... | 16 |
| 6.7. ACCIDENTE ȘI COMPLICAȚII ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL | 16 |
| 6.7.1.ACIDENTE..... | 16 |
| 6.7.2. COMPLICAȚII..... | 17 |

1. LISTA DE DIFUZARE

| Nr. crt. | Scopul difuzării | Microstructura/Persoana | Data difuzării | Semnătura |
|-------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 1. | Informare și Aplicare | Secția Clinică de Chirurgie OMF Conf. Dr. Octavian Dincă | 19.11.2018 | |
| 2. | | Ambulatoriul despecialitate Chirurgie OMF Dr. Tiberiu Niță | 19.11.2018 | |

2. SCOP ȘI OBIECTIVE (MOTIVARE ȘI FUNDAMNETARE)

Protocolul a fost elaborat cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice în cazul pacienților care necesită tratament al infecțiilor oro-maxilo-faciale.

Deși protocolul reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi științifice disponibile în domeniu, nu trebuie considerat că aceste recomandări includ toate intervențiile potrivite sau exclud pe toate cele nepotrivite pentru situația în cauză. Protocolul nu intenționează să înlocuiască raționamentul medical la fiecare caz în parte. Decizia medicală trebuie să ia în considerare particularitățile individuale și opțiunea pacientului, precum și resursele, caracterele specifice și limitările institutilor de practica medicală. Fiecare medic care aplică recomandările în scopul stabilirii unui plan terapeutic trebuie să utilizeze propriul raționament medical independent, în funcție de fiecare caz în parte și în funcție de experiența personală în corelație cu dotarea institutiei în care acesta își desfășoară activitatea.

Specialiștii care au elaborat acest protocol au depus eforturi pentru ca informația conținută în acesta să fie corectă, redată cu acuratețe și susținută de dovezi. Dată fiind posibilitatea erorii umane și/sau progresele cunoștințelor medicale, ele nu pot și nu garantează că informația conținută în protocol este în totalitate corectă și completă. Recomandările din acest protocol sunt bazate pe consensul autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul elaborării materialului.

Persoanele care au elaborat acest protocol își declină responsabilitatea legală pentru orice inacuratețe, informație percepță eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărei metode terapeutice detaliate în acest protocol, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor.

În fiecare caz specific, utilizatorii protocolului trebuie să consulte literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente și să confirme că informația conținută în recomandări, este corectă.

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

Acest material, ca de altfel toate protoalele sunt supuse unui proces de revizuire și actualizare continuă.

3. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul protocol se aplică în cadrul următoarelor compartimente:

- Secția Clinică de Chirurgie OMF,
- Ambulatoriul de specialitate al spitalului Chirurgie OMF

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE PROTOCOLULUI

Compendiu de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială PROF. DR. ALEXANDRU BUCUR

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

| Nr. cert. | Termenul | Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul |
|------------------------|--------------------|--|
| 5.1. DEFINIȚII: | | |
| 1. | Protocolul medical | Reprezintă un set de recomandări pentru rezolvarea unei probleme clinice, ghid în îngrijirea pacientului sau sprijin medical în efectuarea unei proceduri (Medical Dictionary) |
| 5.2. ABREVIERI: | | |
| 1. | OMF | Oro-maxilo-facială |
| 2. | AINS | Antiinflamatoare nesteroidiene |

6. DESCRIEREA PROTOCOLULUI

6.1. PRINCIPII GENERALE DE TRATAMENT ÎN INFECȚIILE ORO-MAXILO-FACIALE

- infecțiile oro-maxilo-faciale sunt urgențe medico-chirurgicale, iar tratamentul trebuie să fie precoce și complex (chirurgical, antibioteric, reechilibrare hidroelectrolitică)
- incizia se practica în zone declive pentru a permite drenajul gravitațional, chiar dacă acestea interferă zonele estetice faciale sau cervicale
- incizia nu se practică în zonele centrale ale tumefacției, slab vascularizate
- alegerea locului de incizie trebuie să țină cont de spațiile anatomici afectate, de o eventuală evoluție în spații fasciale vecine, de structurile vitale prezente la acel nivel, de tipul de drenaj, de posibilele sechele postoperatorii.

- incizia trebuie să faciliteze pătrunderea în spațiile fasciale afectate, dar și în spațiile fasciale vecine ce ar putea fi afectate de extensia supurației.
- inciziile cutanate sunt largi pentru a facilita accesul operatorului și drenajul colecției purulente, cu evacuarea țesuturilor necrozate.
- disecția practicată pentru drenaj este boantă.
- drenajul supurației se practică preferabil cu tuburi fixate la tegument sau
- mucoasă; drenajul trebuie să permită evacuarea colecției purulente dar și
- spălăturile antiseptice. Tuburile de dren se mențin 24- 72 de ore, până când secreția purulentă diminuează semnificativ
- spălăturile antiseptice efectuate sunt unidirectionale
- tratamentul factorului cauzal (de regulă patologie dento-parodontală):
 - a) drenaj endodontic, dacă dintele cauzal poate fi conservat
 - b) extracție dacă dintele este compromis (după examen clinic și radiologic).

6.2. CLASIFICAREA INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE

6.2.1. INFECȚII NESPECIFICE

6.2.1.1. Infecții periosoase

- spațiul vestibular
- spațiul palatinal
- spațiul corpului mandibular

6.2.1.2. Infecțiile spațiilor fasciale

a) primare maxilare

- bucal
- canin
- infratemporal

b) primare mandibulară

- bucal
- submandibular
- submentonier
- sublingual

c) secundare

- maseterin

- pterigomandibular
- temporal superficial și profund
- laterofarigian
- prevertebral
- parotidian

d) localizări particulare

- abcesul limbii
- abcesul orbitei

6.2.1.3. Supurații difuze

- flegmonul planșeului bucal
- flegmonul difuz hemifacial

6.2.1.4. Fasciite necrozante

6.2.1.5. Limfadenite

- acute
- cronice

6.2.1.6. Infecții osoase

- osteoperiostită
- osteită
- osteomielită
 - a. supurată acută
 - b. supurată cronică
 - c. nesupurată
- osteonecroză

6.2.1. INFECȚII SPECIFICE

- Actinomicoză
- Sifilis
- TBC

6.3. TIPUL DE ANESTEZIE ÎN INFECTIILE ORO-MAXILO-FACIALE

6.3.1. ANESTEZIA LOCO-REGIONALĂ

Se recomandă practicarea acesteia în următoarele situații :

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

- abcese localizate ale părților moi;
- abcese periosoase fără implicarea spațiilor fasciale secundare;
- în cazul pacienților care refuza anestezia generală;
- în cazul supurațiilor la pacienți cu stare generală alterată, când anestezia generală este contraindicată, tratamentul chirurgical fiind o urgență.
- când nu există posibilitatea efectuării anesteziei generale în Secția/Compartimentul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială

6.3.2. ANESTEZIA GENERALĂ

Se recomandă practicarea acesteia în următoarele situații:

- în cazul inciziilor cutanate;
- în abcesele de spații fasciale;
- în supurații cu evoluție extensivă și rapidă, când este necesară explorarea spațiilor fasciale învecinate;
- copii;
- pacienți necooperanți.

6.4. CONDIȚII DE TRATAMENT ÎN SECȚIA/COMPARTIMENTUL DE CHIRURGIE OMF A PACIENȚILOR CU INFECȚII ORO-MAXILO-FACIALE

Următoarele categorii de pacienți vor fi tratați în condiții de spitalizare în Secția/Compartimentul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- pacienți cu afecțiuni generale asociate;
- pacienți cu status imun compromis (diabet, afecțiuni renale, alcoolism, tumori maligne, tratamente imunosupresoare);
- stare toxicoseptică evaluată clinic;
- evoluție rapidă a supurației;
- extensie în spații fasciale de vecinătate;
- pacienți care necesită anestezie generală;
- risc crescut de hemoragie postoperatorie;
- necesitatea de urmărire postoperatorie continuă, la pacienți cu supurații severe asociate sau nu cu afecțiuni sistemicе.

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

6.5. ANTIBIOTERAPIA PACIENTILOR CU INFECȚII ORO-MAXILO-FACIALE

Se administrează antibiotice la următoarele categorii de pacienți:

- pacienți cu patologie generală asociată;
- pacienți cu supurații cu evoluție și extensie rapidă;
- pacienți cu supurații ale spațiilor fasciale;
- pacienți cu supurații perimandibulare cu evoluție îndelungată;
- pacienți cu stare generală alterată, cu febră peste 38°C sau tulburări de respirație.

Antibioterapia de primă intenție

Constă în administrarea de antibiotice uzuale, de preferință în asociere, eficiente pe flora aerobă și anaerobă.

Antibioterapia țintită

Se recomandă administrarea conform antibiogramei ori de câte ori este posibil, în funcție de baza tehnico-materială, în următoarele situații:

- tratamentul inițial antibiotic ineficient;
- extensia supurației sub tratamentul antibiotic de primă intenție;
- supurații severe în spațiile fasciale;
- alergii la antibioticele uzuale;
- pacienți cu afecțiuni generale sistemice;
- supurații perimandibulare (risc de osteomielită);
- evoluție îndelungată, sau cu tratamente antibiotice repetitive în antecedente.

6.6. FORMELE ANATOMO-CLINICE ALE INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE

6.6.1. CELULITA

Tratamentul se poate desfășura în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.2. ABCESUL VESTIBULAR

Tratamentul se poate desfășura în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizie și drenaj pe cale orală

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECTIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.3. ABCESUL PALATINAL

Tratamentul se poate desfășura în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizie și drenaj pe cale orală
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare.

6.6.4. ABCESUL SPAȚIULUI FASCIAL AL CORPULUI MANDIBUAR (ABCESUL PERMANDIBULAR EXTERN, PERIBAZILAR)

Tratamentul se institue în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenaj pe cale cutanată
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.5. ABCESUL SPAȚIULUI GENIAN

Tratamentul se poate desfășura în ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat în funcție de localizarea supurației
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.6. ABCESUL SPAȚIULUI PARAMANDIBULAR (ABCESUL BUCCINATO-MAXILAR, ABCESUL MIGRATOR AL OBRAZULUI)

Tratamentul se institue în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.7. ABCESUL SPAȚIULUI CANIN

Tratamentul se poate desfășura în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

- incizie și drenaj pe cale orală
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.8. ABCESUL SPAȚIULUI INFRATEMPORAL

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială

- incizia și drenajul se pot practica oral și/sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.9. ABCESUL SPAȚIULUI SUBMANDIBULAR

Tratamentul se instituie în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se practică pe cale cutanată (abordul oral este indicat numai în cazul evoluției supurației în "recessus-ul submandibular")
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.10. ABCESUL SPAȚIULUI SUBLINGUAL

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.11. ABCESUL SPAȚIULUI SUBMENTONIER

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizie și drenaj pe cale cutanată
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

6.6.12. ABCESUL SPAȚIULUI MASETERIN

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- tratamentul dintelui cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.13. ABCESUL SPAȚIULUI PTERIGOMANDIBULAR

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.14. ABCESUL SPAȚIULUI TEMPORAL SUPERFICIAL/PROFUND

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se practică pe cale cutanată
- tratament medicamentos: (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.15. ABCESUL SPAȚIULUI LATEROFARINGIAN

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radicală sau conservatoare

6.6.16. ABCESUL SPAȚIULUI RETROFARINGIAN

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se pot practica oral sau cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de dintele cauzal: radical

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

6.6.17. ABCESUL SPAȚIULUI PAROTIDIAN

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenaj prin abord cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de factorul cauzal

6.6.18. ABCESUL DE LIMBĂ (PORTIUNEA PRESULCALĂ)

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul se practică oral
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de factorul cauzal

6.6.19. ABCESUL ORBITEI

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul prin abord cutanat
- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.)
- atitudinea față de factorii cauzali

6.6.20. FLEGMONUL DE PLANȘEU BUCAL

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizie numai prin abord cutanat și drenajul multiplu al spațiilor fasciale primare
- explorarea , dacă este cazul, a spațiilor fasciale secundare
- ori de câte ori este posibil, în funcție de baza tehnico-materială, se poate recolta secreție pentru antibiogramă
- drenajul cu tuburi de dren al lojilor implicate, menținut în medie 72 de ore
- reechilibrarea hidro-electrolitică
- antibioterapia, tonicardiace, vitaminoterapie și imunoterapie
- atitudinea față de factorii cauzali

6.6.21. FLEGMONUL DIFUZ HEMIFACIAL

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizii cutanate și orale, drenajul multiplu al spațiilor fasciale

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

- ori de câte ori este posibil, în funcție de baza tehnico-materială, se poate recolta secreție pentru antibiogramă
- drenajul cu tuburi de dren al lojilor implicate, menținut în medie 72 de ore
- reechilibrarea hidro-electrolitică
- antibioterapia, tonicardiace, vitaminoterapie și imunoterapie
- atitudinea față de factorul cauzal

6.6.22. FASCIITA NECROZANTĂ

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizia și drenajul prin abord cutanat
- incizii largi, cu abordul spațiilor fasciale afectate, și eventual explorarea spațiilor fasciale ce ar putea fi interesante
- necrectomie (îndepărțarea țesuturilor necrotice fasciale, țesut subcutanat, tegumentare, muscular)
- drenajul plăgii
- irigații largi cu soluții antiseptice
- antibioterapie
- consult interdisciplinar în cazul evoluției către mediastin, impunând de cele mai multe ori transferul bolnavului într-un serviciu de chirurgie toracică.
- atitudinea față de factorul cauzal
- plastia defectului după remiterea completă a fenomenelor supurative

6.6.23. ADENITA

Tratamentul se instituie în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- tratament medicamentos (antibiotice, antialgice, AINS etc.) în faza congestivă
- tratament chirurgical (incizie și drenaj), în funcție de stadiul clinic evolutiv
- atitudinea față de factorul cauzal (conservator/radical)

6.6.24. OSTEOPERIOSTITA

Tratamentul se instituie în condiții de ambulator sau în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- atitudinea față de dintele cauzal: extractia

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

- tratament medicamentos (antibioterapie, imunoterapie etc.)

6.6.25. OSTEITA

Tratamentul se instituie în condiții de ambulator sau în Secție/Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- atitudinea față de dintele cauzal: extracția
- chiuretaj osos
- tratament medicamentos (antibioterapie, imunoterapie etc.)

6.6.26. OSTEOMIELITA ACUTĂ SUPURATĂ

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- tratament antibiotic
- incizia abceselor periosoase, lărgirea traiectelor fistuloase
- spălături abundente cu soluții antiseptice
- extracția dintilor cauzali

6.6.27. OSTEOMIELITA CRONICĂ

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție/ Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, în funcție de evoluția clinică:

- corticotomie
- sechectrectomie
- rezecție osoasă segmentară și refacerea continuității osoase cu placă de reconstrucție
- antibioterapie

6.6.28. NECROZA OSOASĂ POSTIRADIERE

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- drenajul colecțiilor supurate și irigații cu soluții antiseptice
- sechectrectomie – pentru sechestrele osoase delimitate
- rezecție osoasă segmentară și refacerea continuității osoase cu placă de reconstrucție
- antibioterapie

| | | |
|---|--|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO- FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" | PROTOCOL DE TRATAMENT AL INFECȚIILOR ORO-MAXILO-FACIALE | Ediția: I Revizia: 0 Data implementării: 19.11.2018 |
|---|--|---|

6.6.29. OSTEONECROZA MAXILARELOR DUPĂ TRATAMENT CU BIFOSFONATI

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- debridare prin manopere cât mai puțin traumatizante
- sechectrectomie, după confirmarea radiologică a delimitării complete a sechestrului osos
- refacerea continuității osoase cu placă de reconstrucție în cazul fracturii în os patologic
- antibioterapie

6.6.30. ACTINOMICOZA

Tratamentul se instituie în condiții de spitalizare în Secție / Compartiment de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială:

- incizii largi ale abceselor, lărgirea traiectelor fistuloase și îndepărțarea țesutului de granulație.
- recoltare secreție pentru antibiogramă și fragmente tisulare pentru examen histopatologic și bacteriologic.
- în cazul actinomicozei osoase abordarea geodelor osoase se realizează de preferință pe cale orală, iar în caz de recidivă se practică rezecții osoase marginale sau segmentare.
- meșe iodoformate îmbibate în proteinat de Ag sau povidonă
- atitudinea față de dintele cauzal
- antibioterapie

6.7. ACCIDENTE ȘI COMPLICATII ALE TRATAMENTULUI CHIRURGICAL

6.7.1. ACCIDENTE

- leziuni ale marilor vase
- leziuni ale nervilor periferici (mentonier, infraorbitar)
- leziuni ale ramurilor nervului facial.

Adeseori, plăgile traumaticice duc la formarea de cicatrici care induc un deficit estetic sau/și funcțional. În aceste situații, este uneori necesară reintervenția, care poate consta în:

- explorarea chirurgicală a plăgii, cu reposiționarea corectă la nivelul punctelor-cheie;
- detensionarea cicatricilor retractile, prin diverse metode de plastie;
- excizia zonelor care prezintă tatuaje traumaticice ca urmare a retenției de corpi străini de mici dimensiuni;
- aplicarea locală de creme pe bază de corticoizi, pentru cicatricile hipertrofice.

6.7.2. COMPLICĂȚII

- hemoragie
- obstrucția căilor aeriene
- tromboflebita de sinus cavernos
- mediastinite
- complicații septice multiorganice
- necroze tegumentare
- tulburări de sensibilitate pe traiectul n.alveolar inferior și infraorbitar
- tulburări de motilitate pe traiectul ramurilor n.facial.